

2009年9月

紐約市健康及心理衛生局

新生健康檢查要求

(適用於公立學校、私立學校、教會學校、日托中心及學校)

凡第一次入讀紐約市學校的學生必須

接受全面健康檢查

全面健康檢查必須包括：

- 所有要求的免疫注射

此外，健康檢查還應包括以下各項：

體重
身高
身高體重指數 (BMI)
血壓
病史
營養評估

視力篩查
聽力篩查
牙科篩查
發展評估
僅限日託兒童：
貧血篩查
(血容積比或血紅蛋白)

鉛中毒評估和檢查

- 凡未滿6歲的兒童必須每年進行鉛接觸危險性的檢查。
- 1歲和2歲的兒童和其他6歲或不滿6歲並有接觸鉛的危險的兒童或者沒有接受過鉛檢查記錄的兒童按要接受血鉛水平檢查。
- 詳細情況請致電311與鉛中毒預防計劃 (Lead Poisoning Prevention Program) 聯絡。

此外，學前班和幼稚園兒童在未滿六歲之前必須每年進行體檢。

中學新生肺結核檢查須知

- 凡第一次入讀紐約市公立或私立中學 (包括初中及各種類型的高中) 的新生必須接受結核菌苗測試 (Mantoux Tuberculin Skin Test, 又稱 PPD), 並且在測試後的48至72小時之間確定並記錄測試結果。如果學生曾經入讀過紐約市的任何公立、私立或教會學校, 則學生不需要接受肺結核檢查。檢查結果必須以毫米 (millimeter) 為單位記錄結果硬結。此外, 也可以採用經核准的血液式肺結核診斷測試。
- 學校接受入學前一年之內或者入學後14天之內進行的有書面記錄的結核菌苗測試結果 (Mantoux Tuberculin Skin Test) 或者是經核准的血液式肺結核測試結果。
- 接受過卡介苗注射 (BCG vaccination) 的兒童同樣必須接受肺結核感染的檢查。
- 經醫療服務提供者確認肺結核檢查結果為陽性的兒童按要必須在14個上學日之內接受醫療評估檢查及胸腔的X光透視並在這期間來校上學。
- 持有陽性反應肺結核檢查結果病史及相關X光透視報告的學生應獲准入學, 並被轉介給學校護士或學區監管護士以接受評估檢查及後續觀察。
請注意: 如果學生無法在注射麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR) 或任何其他活疫苗之前或在注射該疫苗的同一天接受肺結核檢查, 那麼學生必須先等待六 (6) 個星期, 然後才可以接受肺結核檢查。不過, 學生在等待接受檢查的這段時間可以上學。
- 如果學生有可能患有潛伏性結核感染 (LBTI), 我們強烈建議學生接受治療。(請參考潛伏性結核感染檢查和治療指南, 2006年4月, <http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/chi/chi25-4.pdf>)
- 如果出現以下情況, 學生將不得上學:
學生在入學後的14個上學日之內無法出示書面的肺結核檢查結果。
或者
學生屬於肺結核檢查結果為陽性的新生並且在入學後的14個上學日之內無法出示書面的胸腔X光透視及評估。

欲知詳情, 請致電結核病管轄局 (Bureau of Tuberculosis Control) 查詢, 電話是(212) 442-9968。

學校健康計劃各區辦公室

電話號碼

學校健康局第一區-	212-280-9230/1	-教育局第1、2、3、4、5和6學區
學校健康局第二區-	718-579-6853/54	-教育局第7、8、9、10、11和12學區
學校健康局第三區-	718-336-2553x112	-教育局第17、18、19、21、22、23和32學區
學校健康局第四區-	718-495-0507	-教育局第13、14、15、16、20和31學區
學校健康局第五區-	718-520-4950	-教育局第24、25、26、27、28、29和30學區

2009年9月

全體學生免疫要求

紐約市健康及心理衛生局

以下是法律規定的免疫注射要求。
凡沒有達到這些要求的學生均不得上學。

適用於所有年齡滿兩個月至十八歲的學生。

須嚴格按**要求完成**

學生的免疫記錄必須包括下列所有疫苗的注射，才能被視為達到所有免疫要求。應根據學生本學年入讀的年級檢查該生的免疫記錄。

日托/學前班	劑量
白喉、破傷風、全細胞性百日咳混合疫苗 (diphtheria-tetanus-acellular pertussis, 簡稱DTaP) 或者白喉、破傷風、百日咳混合疫苗 (diphtheria-tetanus-pertussis, 簡稱DTP)	4劑 第四劑應該在第三劑注射後的至少6個月之後注射。
口服小兒麻痺疫苗 (oral poliovirus, 簡稱OPV) 或者注射式小兒麻痺疫苗 (inactivated poliovirus, 簡稱IPV)	3劑
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (measles-mumps-rubella, 簡稱MMR)	1劑 在滿1歲時或之後注射。
B型嗜血桿菌疫苗 (Haemophilus influenzae type b, 簡稱Hib)	1劑、2劑或3劑 滿15個月時或之後，注射一劑。 如果未滿15個月，則視相應年齡須注射3劑。
乙型肝炎疫苗 (Hepatitis B)	3劑
水痘疫苗 (Varicella)	1劑 在滿1歲時或之後注射。
肺炎雙球菌結合型疫苗 (Pneumococcal conjugate, 簡稱PCV)	1劑、2劑或3劑 視年齡情況，適用於所有在2008年1月1日及該日期之後出生的兒童。
幼稚園	
白喉、破傷風、全細胞性百日咳混合疫苗 (DTaP) 或者白喉、破傷風、百日咳混合疫苗 (DTP)	4劑 第四劑應該在第三劑注射後的至少6個月之後注射。
口服小兒麻痺疫苗 (OPV) 或者注射式小兒麻痺疫苗 (IPV)	3劑
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)	2劑 第一劑在滿一歲或之後注射，另外，含麻疹疫苗的第二劑 (建議注射MMR混合疫苗) 在第一劑注射之後的至少28天後以及子女至少滿15個月時注射。
乙型肝炎疫苗 (Hepatitis B)	3劑
水痘疫苗 (Varicella)	1劑 在滿1歲時或之後注射。

1年級至12年級	劑量
白喉、破傷風、全細胞性百日咳混合疫苗 (DTaP)、白喉、破傷風、百日咳混合疫苗 (DTP)、白喉、破傷風混合疫苗 (DT)、破傷風、減量白喉混合疫苗 (tetanus-diphtheria, 簡稱Td)、或者破傷風、附加注射白喉、全細胞性百日咳疫苗 (tetanus-diphtheria-acellular pertussis, 簡稱Tdap)	3劑 視年齡注射適合的疫苗類型。
破傷風、附加注射白喉、全細胞性百日咳疫苗，即Tdap (從2007年9月1日開始生效)	1劑 適用於所有1994年1月1日及以後出生並升入6年級、7年級或8年級的學生。
口服小兒麻痺疫苗 (OPV) 或者注射式小兒麻痺疫苗 (IPV)	3劑
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)	2劑 第一劑在滿一歲或之後注射，另外，含麻疹疫苗的第二劑 (建議注射MMR混合疫苗) 在第一劑注射之後的至少28天後以及子女至少滿15個月時注射。
乙型肝炎疫苗 (Hepatitis B)	2劑或3劑 所有年級的全體學生。
3劑的小兒乙型肝炎疫苗，或者，僅限11-15歲兒童：兩劑Merck Recombivax* 成年人乙型肝炎疫苗，注射這兩劑疫苗之間的相隔時間至少為四個月。記錄上必須清楚註明疫苗種類和注射劑量。	
水痘疫苗 (1年級至10年級)	1劑* 適用於所有10年級以下並包括9年級在內的在1994年1月1日及之後出生的學生，第1劑在滿1歲或之後注射。
❖ 品牌名稱的使用並不意味著紐約市健康及心理衛生局對任何產品作廣告宣傳。	
* 雖然只要求接受1劑的疫苗注射，但是我們建議所有學生都接受2劑的含水痘疫苗在內的疫苗注射。	

暫時入學要求

在前兩個月，新生在完成這組最初的疫苗注射之後，可以在持有該組疫苗注射書面記錄的情況下暫時入學。一旦暫時入學，學生必須完成下列的疫苗注射要求，否則將按規定被禁止上學：(1) 白喉、小兒麻痺症及乙型肝炎的第一劑和第二劑之間的注射間隔時間不超過2個月、第二劑和第三劑之間的注射間隔時間不超過6個月，並且(2) 麻疹疫苗 (盡量是麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗，即MMR) 的第一劑和第二劑之間的注射間隔時間不超過2個月。

日托/學前班	劑量
白喉、破傷風、全細胞性百日咳混合疫苗 (diphtheria-tetanus-acellular pertussis, 簡稱DTaP) 或者白喉、破傷風、百日咳混合疫苗 (diphtheria-tetanus-pertussis, 簡稱DTP)	1劑
口服小兒麻痺疫苗 (oral poliovirus, 簡稱OPV) 或者注射式小兒麻痺疫苗 (inactivated poliovirus, 簡稱IPV)	1劑
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (measles-mumps-rubella, 簡稱MMR)	1劑 在滿1歲時或之後注射。
B型嗜血桿菌疫苗 (Haemophilus influenzae type b, 簡稱Hib)	1劑
乙型肝炎疫苗 (Hepatitis B)	1劑
水痘疫苗 (Varicella)	1劑 在滿1歲時或之後注射。
肺炎雙球菌結合型疫苗 (Pneumococcal conjugate, 簡稱PCV)	1劑 適用於所有在2008年1月1日或之後出生的兒童。

幼稚園/1年級至12年級	劑量
白喉、破傷風、全細胞性百日咳混合疫苗 (DTaP)、白喉、破傷風、百日咳混合疫苗 (DTP)、白喉、破傷風混合疫苗 (DT)、破傷風、減量白喉混合疫苗 (tetanus-diphtheria, 簡稱Td)、或者破傷風、附加注射白喉、全細胞性百日咳疫苗 (tetanus-diphtheria-acellular pertussis, 簡稱Tdap)	1劑 視相應年齡注射適合的疫苗類型。
破傷風、附加注射白喉、全細胞性百日咳疫苗，即Tdap (從2007年9月1日開始生效)	1劑 適用於所有1994年1月1日及以後出生並升入6年級、7年級或8年級的學生。
口服小兒麻痺疫苗 (OPV) 或者注射式小兒麻痺疫苗 (IPV)	1劑
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)	1劑 在滿1歲時或之後注射。
乙型肝炎疫苗 (Hepatitis B)	1劑
水痘疫苗 (幼稚園至10年級)	1劑 適用於所有10年級以下並包括9年級在內的在1994年1月1日及之後出生的學生，第1劑在滿1歲或之後注射。

學生必須根據一定的日程表繼續按照上述臨時性時間段接受疫苗注射。學生必須依法完成整套疫苗注射。必須對沒有在暫時入學期內完成疫苗注射的學生發出停學信函，並停止學生繼續上學，直至達到要求為止。

關於疫苗注射詳情或為您的子女查詢疫苗注射醫師，請致電311。