

ستمبر 2014

اسکول میں نوواردین کے لیے طبی مطلوبات (پبلک، پرائیویٹ، مذہبی، ڈے کنٹیر مراکز اور اسکول)

نیویارک شہر اسکول میں پہلی مرتبہ داخل ہونے والے تمام طلبا کے پاس ایک مکمل جسمانی معائنہ اور

تمام مدافعتی ٹیکوں کے ریکارڈ کا ہونا لازمی ہے

بچے کے بچپن کے طبی معائنے کے فارم (CH205) کو اس جامع طبی معائنے میں قلم بند کیا جانا لازمی ہے اور اس میں ذیل کا شامل ہونا لازمی ہے:

وزن	قد	بلڈ پریشر	باڈی ماس انڈکس (BMI)	بصری جانچ
سماعتی جانچ	دانتوں کی جانچ	طبی پس منظر	نشو و نما کی تشخیص	غذائی تشخیص

اسکول میں داخلے کے سال کی 1 اپریل تک یا اس کے بعد CH-205 معائنہ کیا جانا لازمی ہے۔ داخلے کے سال کی 1 اپریل سے قبل کیے گئے معائنے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ قابل پر کیے جانے والے وہ CH-205 فارم جس میں طلبا کے ٹیکوں کی تاریخ پہلے سے پر ہو نیو شہر مدافعتی ٹیکوں کی رجسٹری (CIR) کے ذریعے دستیاب ہیں۔ پری کنڈر گارٹن سے کنڈر گارٹن میں تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کے لیے نیا CH-205 جمع کروانا لازمی ہے۔

جانچ	مطلوبہ معلومات
خون میں سرخ ذرات کی کمی (انیمیا) کی جانچ	Hematocrit یا Hemoglobin) خون کی کمی کی جانچ
سیسہ کی زہریت (Lead Poisoning) کی تشخیص اور جانچ	<ul style="list-style-type: none"> 6 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو سالانہ سیسہ کے زہر کے خطرے کے لیے تشخیص کرنا لازمی ہے۔ خون میں سیسہ کی مقدار کے لیے 1 اور 2 سالہ بچوں کی اور دوسرے بچوں کی 6 سال کی عمر تک جو متاثر ہونے کے خطرے میں ہیں یا جن کا سابقہ خون میں سیسہ کے ٹیسٹ کا ریکارڈ نہیں ہے ان کی جانچ مطلوب ہے۔ مزید معلومات کے لیے 311 کے لیڈ پوائزنگ ریپونشن پروگرام کو فون کریں

2014-15 کی مدافعتی ٹیکوں کی مطلوبات

قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ دو مہینے اور اٹھارہ سال کے درمیان کی عمر کے تمام طلبا کو مندرجہ ذیل مدافعتی ٹیکے لگ جانا مطلوب ہے۔ بچوں کو اسکول سے خارج کر دینا چاہیے اگر وہ ان مطلوبات کی تکمیل نہیں کرتے ہوں۔

مکمل طور پر مامون سمجھے جانے کے لیے نئے طلبا کے مدافعتی ٹیکوں کے ریکارڈ میں تمام مندرجہ ذیل ٹیکوں کا شامل ہونا لازمی ہے۔ ان کے مدافعتی ٹیکوں کے ریکارڈ کی تشخیص ان کے شرکت کرنے والے تعلیمی سال کے گریڈ کے مطابق کی جانی چاہیے۔

عارضی مطلوبات

نئے طلبا اسکول میں عارضی طور پر داخل ہوسکتے ہیں اگر ان کے پاس کم از کم اس ابتدائی مامونیت کے سلسلے کے دستاویز ہوں۔ ایک بار عارضی طور پر داخل ہوجانے کے بعد، بچے کو عمل سے گزرنے والا تصور کیے جانے کے لیے لازمی ہے کہ بعد ازاں ٹیکے کمیٹی برائے مدافعتی ٹیکوں کے طریقے (ACIP) کیچ اپ (CATCH UP) کے مطابق کے لگوائے جائیں۔ اور یہ اسکول میں داخل رہیں (نظام الاوقات کے لیے مندرجہ ذیل ملاحظہ کریں <http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html>) متبادل نظام الاوقات قابل قبول نہیں ہیں۔

طلبا کے لیے قانون کی تکمیل کرنے کے لیے پورے سلسلے کو مکمل کرنا لازمی ہے۔ وہ طلبا جن کو عارضی گوشوارہ وقت کے دوران ٹیکے نہیں لگے ہیں ان کو اسکول سے خارج کیے جانے کے خطوط جاری کیے جانے چاہییں اور ان کو اس وقت تک اسکول سے خارج رکھا جانا چاہیے جب تک کہ یہ مطلوبات کی تکمیل نہ کر لیں۔

خوراکوں کی تعداد	ڈے کنٹیر / پری کنڈر گارٹن
1	DTaP, DTP, DT, Td (tetanus-diphtheria)
1	Tdap (tetanus-diphtheria-acellular pertussis)
1	Tdap
1	OPV یا IPV
1	MMR
1	Hepatitis B
1	Varicella

خوراکوں کی تعداد	ڈے کنٹیر / پری کنڈر گارٹن
1	DTaP (diphtheria-tetanus-acellular pertussis)
1	DTP (diphtheria-tetanus-pertussis)
1	OPV (oral poliovirus) یا IPV (inactivated poliovirus)
1	MMR (measles-mumps-rubella)
1	Hib (Haemophilus influenzae type b)
1	Hepatitis B
1	Varicella
1	Pneumococcal conjugate (PCV)
1	Influenza

اس کا دارومدار ان کی انفلونزا کے ٹیکوں کے لگنے کے پس منظر پر ہے، کچھ بچوں کو انفلونزا کی دو خوراکیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

مکمل تعمیم

تعلیمی سال 2014-15

اسکول میں نوواردین / حاضری¹ کے لیے نیو یارک ریاست کی مطلوبات

نوٹس: ٹیکوں کی خوراک کی تعداد کا دارومدار مشاورتی کمیٹی برائے مدافعتی ٹیکوں کے طریقہ کار (ACIP) کے تجویز کردہ نظام الاوقات پر ہے۔ ذیل نظام الاوقات گریڈ کنڈر گارٹن تا 12 کے لیے مطلوب کم سے کم خوراک کی عکاسی کرتے ہیں۔ 0 سے 18 سال کی عمر کے افراد کے لیے ٹیکوں کی خوراک کے وقفوں ACIP کے تجویز کردہ نظام الاوقات کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہر ایک ٹیکے کے لیے مخصوص معلومات کے لیے صفحے کے آخر میں حاشیے کو ملاحظہ کریں۔

2014 مکمل تعمیم					
گریڈ 7 تا 12	گریڈ 6	گریڈ 1 تا 5	کنڈر گارٹن	پری کنڈر گارٹن (ڈے کیئر، ہیڈ اسٹارٹ، نرسری یا پری کنڈر گارٹن)	ٹیکے (ویکسین)
3 خوراکیں	3 خوراکیں	4 تا 5 خوراکیں اگر DTap کی چوتھی خوراک 4 سال یا اس بڑی عمر میں دی گئی تھی تو 5 خوراک (بوسٹر) کی ضرورت نہ پڑے	4 تا 5 خوراکیں اگر DTap کی چوتھی خوراک 4 سال یا اس بڑی عمر میں دی گئی تھی تو 5 خوراک (بوسٹر) کی ضرورت نہ پڑے۔	4 خوراکیں	Tetanus toxoid اور Diphtheria پر مشتمل ٹیکے DTaP/DPT/Tdap
1 خوراک	1 خوراکیں	ناقابل اطلاق	ناقابل اطلاق	ناقابل اطلاق	Tetanus toxoid پر مشتمل ٹیکے اور Pertussis vaccine booster (Tdap)
3 خوراکیں	3 تا 4 خوراکیں	3 تا 4 خوراکیں اگر 4 سال کی عمر سے قبل 4 خوراکیں دی جا چکی ہیں تو اضافی خوراک 4 سے کر 6 سال کی عمر درمیان دی جانی چاہیے۔ 4 سال یا اس سے بڑی عمر کے وہ بچے جن کو ماضی میں 3 سے کم خوراکیں دی گئی ہیں، ان کے لیے کل تین خوراکیں مطلوب ہیں۔ اگر OPV اور IPV سلسلے کے طور پر دی جا چکی ہیں تو، بچے کی عمر کے قطع نظر کل 4 خوراکیں موصول کی جانی چاہیے۔	3 تا 4 خوراکیں اگر 4 سال کی عمر سے قبل 4 خوراکیں دی جا چکی ہیں تو اضافی خوراک 4 سے کر 6 سال کی عمر درمیان دی جانی چاہیے۔ 4 سال یا اس سے بڑی عمر کے وہ بچے جن کو ماضی میں 3 سے کم خوراکیں دی گئی ہیں، ان کے لیے کل تین خوراکیں مطلوب ہیں۔ اگر OPV اور IPV سلسلے کے طور پر دی جا چکی ہیں تو، بچے کی عمر کے قطع نظر 4 خوراکیں موصول کی جانی چاہیے۔	3 خوراکیں	Polio (IPV/OPV)
2 خوراک	2 خوراک	2 خوراک	1 خوراک پہلی سالگرہ یا اس کے بعد، اور دوسری خوراک 7 سال کی عمر تک مطلوب ہے۔	1 خوراک	Measles, Mumps and Rubella (MMR)
3 خوراک	3 خوراک	3 خوراک	3 خوراک	3 خوراک	Hepatitis B
1 خوراک	2 خوراک	1 dose	2 خوراک	1 خوراک	Varicella (Chickenpox)
ناقابل اطلاق	ناقابل اطلاق	ناقابل اطلاق	ناقابل اطلاق	1 تا 4 خوراکیں خوراک کی تعداد کا انحصار بچے کی پہلی خوراک پر ہے، اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔	Haemophilus Influenza type b (Hib)
ناقابل اطلاق	ناقابل اطلاق	ناقابل اطلاق	ناقابل اطلاق	1 to 4 doses خوراک کی تعداد کا انحصار بچے کی پہلی خوراک پر ہے، اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔	Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV)
ناقابل اطلاق	ناقابل اطلاق	ناقابل اطلاق	ناقابل اطلاق	1 خوراک نیو یارک شہر کے 47 اور 43 ضابطے کے پری کنڈر گارٹن پروگرام (ڈے کیئر ہیڈ اسٹارٹ، یا پری کنڈر گارٹن) میں مندرج 6 ماہ سے 59 ماہ کی عمر کے بچوں کے لیے لازمی ہے کہ یہ 1 جولائی اور 31 دسمبر کے درمیان ایک خوراک موصول کریں۔ کچھ بچوں کو 2 خوراک کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کا انحصار ان کے ٹیکوں کے ریکارڈ پر ہے۔	Influenza

والدین کے لیے نوٹ: مزکورہ مطلوبات ان طلباء کے لیے ہیں جو کو ٹیکے لگانے کا آغاز شیر خوار عمر میں کیا جاتا ہے۔ ان بچوں کے لیے مطلوبات مختلف ہیں جن کو ٹیکے لگانے کا آغاز بری عمر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو براہ کرم اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔

1 خسره (میزلز)، کن پھیڑ، یرکان (ہائپائٹائٹس) B، خسره (وارسیلا) یا پولیو (تمام تینوں اقسام کے لیے) سے مامون ہونے کے ثبوت کا مظاہرہ کرے ان بیماریوں سے مامونیت کے ثبوت کے لیے انسدادی ضد جسمی (ایٹائٹی ہاڈیز) قابل قبول ہیں۔ ایک ڈاکٹر، نائب ڈاکٹر یا پیشہ ور نرس کا اس بات ایک معائنہ کر بچے کو وارسیلا ہو چکی ہے مامونیت کے لیے قابل قبول ثبوت ہے۔

2 صفحے کے ایبریں حاشیے کے نوٹ اپریل 2014 کی عکاسی کرتے ہیں۔ تازہ ترین معلومات اور اکثر اوقات پوچھے جانے والے سوالات کے لیے

<http://www.health.ny.gov/prevention/immunization/schools/> ملاحظہ کریں

مزید معلومات کے لیے آیل سے رابطہ کریں:

New York State Department of Health, Bureau of Immunization, Room 649, Corning Tower ESP, Albany, NY 12237, (518) 473-4437.

New York City Department of Health and Mental Hygiene, Program Support Unit, Bureau of Immunization, 42-09 28th Street, 5th Floor, Long Island City, NY 11101, (347) 396-2433.