

紐約市健康及心理衛生局

## 新生醫療要求

(適用於公立學校、私立學校、教會學校、日托中心及學校)

凡第一次入讀紐約市學校的學生必須

### 接受完整的體檢並接種要求的所有疫苗

這份全面的醫療檢查必須記錄在兒童及青少年健康檢查表  
(CH205) 上，並包括以下內容：

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| ✓ 佢 體                | ✓ 佢 營養評估 |
| ✓ 佢 身高               | ✓ 佢 視力篩檢 |
| ✓ 佢 身高體重指<br>數 (BMI) | ✓ 佢 聽力篩檢 |
| ✓ 佢 血壓               | ✓ 佢 牙齒篩檢 |
| ✓ 佢 病歷               | ✓ 佢 成長評估 |

*僅限日託兒童：*

貧血篩查 (血容積比或血紅蛋白)

鉛中毒評估和測試

- 凡未滿6歲的兒童必須每年進行鉛接觸危險性的檢查。
- 1歲和2歲的兒童和其他6歲或不滿6歲並有接觸鉛的危險的兒童或者沒有接受過鉛檢查記錄的兒童按要要求要接受血鉛水平檢查。
- 欲知詳情，請致電311查詢

「防止鉛中毒計劃」 (Lead Poisoning Prevention Program) 。

從學前班升入幼稚園的學生必須提交一份新的兒童及青少年健康檢查表  
(CH205)

全市學校健康辦公室 聯絡電話  
第1學區至  
第32學區  
(347) 396-4597  
(347) 396-4503

# 2013年 9月

## 適用於所有學生的免疫注射要求

紐約市健康及心理衛生局

以下是法律規定的免疫注射要求。凡沒有達到這些要求的學生均不得上學。

適用於所有年齡介乎兩個月至十八歲的學生。

學生的免疫記錄必須包括下列所有疫苗的注射，才能被視為達到所有免疫要求。應根據學生本學年註冊入讀的年級檢查該生的免疫記錄。

### 必須接種的所有疫苗

托兒所/學前班	劑量
白喉、破傷風、百日咳混合疫苗 (diphtheria-tetanus-acellular pertussis, 簡稱DTaP) 或者白喉、破傷風、百日咳疫苗 (diphtheria-tetanus-pertussis, 簡稱DTP)	4
第四劑應該在第三劑注射後至少6個月之後注射。	
注射式小兒麻痺疫苗 (IPV) 或者口服小兒麻痺疫苗 (OPV)	3
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (measles-mumps-rubella, 簡稱MMR)	1
在滿1歲時或之後注射。	
B型嗜血桿菌疫苗 (Hib)	1、2或3
出生後15個月時或之後1劑。若小於15個月，根據相應年齡而注射。	
乙型肝炎 (Hepatitis B)	3
水痘疫苗 (Varicella)	1
在滿1歲時或之後注射。	
肺炎雙球菌結合型疫苗 (PCV)	1、2或3
視年齡情況，適用於所有在2008年1月1日及該日期之後出生的兒童。	
<b>幼稚園</b>	
白喉、破傷風、性百日咳混合疫苗 (DTaP) 或者白喉、破傷風、百日咳疫苗 (DTP)	4
第四劑應該在第三劑注射後至少6個月之後注射。	
注射式小兒麻痺疫苗 (IPV) 或者口服小兒麻痺疫苗 (OPV)	3
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)	2
在年滿1歲或之後注射一劑，另外，第二劑含麻疹疫苗 (建議注射MMR) 在第一劑注射之後至少28天後注射。	
乙型肝炎 (Hepatitis B)	3
水痘疫苗 (Varicella)	1*
在滿1歲時或之後注射。	

1年級-12年級	劑量
白喉、破傷風、性百日咳混合疫苗 (DTaP)、白喉、破傷風、百日咳疫苗 (DTP)、白喉、破傷風混合疫苗 (DT)、破傷風、減量白喉混合疫苗 (tetanus-diphtheria, 簡稱Td)、或者破傷風、減量混合疫苗、非細胞型百日咳混合疫苗 (tetanus-diphtheria-acellular pertussis, 簡稱Tdap)	3
根據相應年齡注射適合的疫苗類型。	
破傷風、減量混合疫苗、非細胞型百日咳混合疫苗	1
6年級至12年級、在1994年1月1日後出生的所有兒童。	
注射式小兒麻痺疫苗 (IPV) 或者口服小兒麻痺疫苗 (OPV)	3
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)	2
在年滿1歲或之後注射第1劑，另外，第二劑含麻疹疫苗 (建議注射MMR) 在第一劑注射之後至少28天後或超過28天才注射。	
乙型肝炎 (Hepatitis B)	3#
(11歲至15歲的學生可以接受2劑Merck Recombivax HB®成人疫苗，每次接種至少相隔4個月，才符合這項要求。文件必須清楚說明產品和劑量的強度。)	
水痘疫苗 (Varicella)	1
適用於在1994年1月1日及之後出生的所有學生，第1劑在滿1歲或之後注射。	
*雖然只要求接受1劑的水痘疫苗注射，但是我們建議所有學生都接受2劑含水痘疫苗的疫苗注射。	
#品牌名稱的使用並不表示紐約市健康及心理衛生局對任何產品作廣告宣傳。	

### 臨時要求

新生在完成這組最初的疫苗注射的頭兩個月內，可以在持有該組疫苗注射書面記錄的情況下暫時入學。在臨時入學之後，必須按照下列步驟完成疫苗注射：(1) 白喉、小兒麻痺症及乙型肝炎的第一劑和第二劑之間的注射間隔時間不超過2個月、第二劑和第三劑之間的注射間隔時間不超過6個月，並且(2) 含有預防麻疹的疫苗 (儘量是麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗，即MMR) 的第一劑和第二劑之間的注射間隔時間不超過2個月。學生必須依法完成整套疫苗注射。必須對沒有在暫時入學期內完成疫苗注射的學生發出停學信函，並停止學生繼續上學，直至達到要求為止。

日托/學前班	劑量
白喉、破傷風、百日咳混合疫苗 (diphtheria-tetanus-acellular pertussis, 簡稱DTaP) 或者白喉、破傷風、百日咳疫苗 (diphtheria-tetanus-pertussis, 簡稱DTP)	1
注射式小兒麻痺疫苗 (IPV) 或者口服小兒麻痺疫苗 (OPV)	1
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (measles-mumps-rubella, 簡稱MMR)	1
在滿1歲時或之後注射。	
B型嗜血桿菌疫苗 (Haemophilus influenzae type b, 簡稱Hib)	1
乙型肝炎 (Hepatitis B)	1
水痘疫苗 (Varicella)	1
在滿1歲時或之後注射。	
肺炎雙球菌結合型疫苗 (Pneumococcal conjugate, 簡稱PCV)	1
適用於在2008年1月1日或之後出生的所有兒童。	

幼稚園/1年級至 12年級	劑量
白喉、破傷風、性百日咳混合疫苗 (DTaP)、白喉、破傷風、百日咳疫苗 (DTP)、白喉、破傷風混合疫苗 (DT)、破傷風、減量白喉混合疫苗 (tetanus-diphtheria, 簡稱Td)、或者破傷風、減量混合疫苗、非細胞型百日咳混合疫苗 (tetanus-diphtheria-acellular pertussis, 簡稱Tdap)	1
根據相應年齡注射適合的疫苗類型。	
破傷風、減量混合疫苗、非細胞型百日咳混合疫苗	1
適用於在1994年1月1日或之後出生的6年級至12年級的所有學生。	
注射式小兒麻痺疫苗 (IPV) 或者口服小兒麻痺疫苗 (OPV)	1
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)	1
在滿1歲時或之後注射。	
乙型肝炎 (Hepatitis B)	1
水痘疫苗 (Varicella)	1
適用於在1994年1月1日及之後出生的所有學生，第1劑在滿1歲或之後注射。	

關於疫苗注射詳情或為您的子女查詢疫苗注射醫師，請致電 311。

要查看有關目前建議的免疫注射時間表，請看

<http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html>